



**ENCONTRO TRANSDISCIPLINAR DE CUIDADOS DE
PESSOAS COM DEFORMIDADES CRANIOFACIAIS**
XV Jornada Odontológica UNIC

21 a 23 de outubro de 2014

**Reabilitação Estético-Funcional em Paciente Odontopediátrico com Displasia do
Ectoderma: Relato de Um Caso Clínico**

Francielli Sandy Brandão Brito^a; Priscila Nespolo^a; Juliana Severino Lupinetti Noberto^a; Ana
Thereza Saboia de Campos Neves^a; Annelise Podolan Kloster Albuquerque^a; Cintia
Aparecida Damo Simões^a

^aUniversidade de Cuiabá. Curso de Odontologia. Cuiabá, MT.

Resumo

A displasia ectodérmica pertence a um grupo amplo de síndromes que prejudicam as estruturas corporais provenientes do ectoderma. As estruturas corporais mais comumente afetadas incluem cabelo, unhas, dentes, glândulas sudoríparas e mucosas. Paciente do gênero masculino, nove anos de idade, compareceu a Clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade de Cuiabá (UNIC), procurando serviço odontológico para a confecção de novas próteses dentárias. Durante a anamnese do paciente, a mãe relatou que o filho nasceu com fissura lábio-palatina e seu tratamento cirúrgico corretivo foi realizado no Hospital Geral Universitário da UNIC. Ao exame físico, observou-se escassez de pelos, sobrancelhas e cílios, cabelo fino, pele hipohidratada e fronte proeminente, características sugestivas de displasia ectodérmica. Ao exame intra oral observou-se que o paciente apresentava hipodontia, estando presente apenas os segundos molares decíduos e os primeiros molares permanentes. A radiografia panorâmica mostrou a presença dos germes dos segundos molares permanentes inferiores, confirmando a ocorrência de hipodontia também na dentição permanente. Dentro da proposta de reabilitação estético-funcional, optou-se pela confecção de próteses parciais removíveis. Na instalação das próteses parciais removíveis pequenos ajustes foram realizados e o paciente foi orientado quanto a utilização e manutenção das mesmas. O caso foi concluído em quinze dias e a satisfação do paciente foi imediata. A reabilitação oral precoce do paciente portador de displasia ectodérmica é fundamental para restabelecer as condições estéticas, funcionais e psicológicas da criança.

Palavras-chaves: Odontopediatria. Displasia do Ectoderma. Hipodontia